

## CATALOGO DE OFIDIOS DE COLOMBIA

Por: Marco A. Serna F.S.C.\*

### INTRODUCCION

Colombia posee una herpetofauna extraordinaria muy rica en variedad y formas, aunque no siempre en individuos o biomasa de cada especie, pues hay formas sumamente raras.

Esto se debe a la gran variedad de climas y ecosistemas. Desafortunadamente, gran número de especies son poco conocidas o lo son muy superficialmente.

Al presente se han señalado unas 240 especies de serpientes para Colombia, pero hay un buen número que debe encontrarse en nuestro territorio pero debido al insuficiente estudio no han sido coleccionadas. Unos pocos científicos colombianos y un buen número de extranjeros se ha ocupado de nuestras serpientes. Entre los primeros tenemos a Evaristo García, Andrés Posada Arango, Hno. Nicéforo María, Hno. Daniel, Federico Medem, Ricardo Tinoco y Rodrigo Angel; entre los extranjeros, más numerosos, tenemos a Afranio do Amaral, George R. Boulenger, Emmet Reid Dunn, Edmard Hallowell, Gerrges Ian, Rober Mertens, James R. Peters, Alcides Prado, Janis D. Roze, Hermann Schiegel y Auguste H.A. Duméril entre otros.

En nuestra Patria donde el medio ambiente se deteriora cada vez más a pesar del esfuerzo que hace Inderena por conservar los basques y las especies zoológicas que habitan en ellos, la destrucción continúa y la extinción de especies es cada vez más glarmante. Otro factor que influye en la desaparición de serpientes y ranas, paralelo a la acción de colonización de terrenos por el hombre es el incremento de animales domésticos como gallinas, patos, cerdos etc. que las destruyen en gran cantidad.

Como un complemento al interesante libro sobre "Serpientes de Colombia" que acaba de publicar el Dr. Ricardo Tinoco (1977), Director del Zoológico de Barranquilla, nos atrevemos a intentar sacar en limpio la lista de las Serpientes de Colombia.

No tenemos otro mérito que el de disponer de buena literatura sobre lo poco que se ha escrito sobre las serpientes de

nuestro medio; en especial nos hemss servido del libro: "Catalogue of the Beotropical Squamata: Parte 1. Snakes" de los doctores James A. Peters y Braulio Orejas-Miranda (1970), quienes han sintetizado más o menos todos los conocimientos que sobre serpientes se han publicado en América Tropical hasta la fecha. En el libro figuran también las atinadas modificaciones sobre nomenclatura y taxonomía que eran indispensables en grupos poco conocidos o de figuración errónea.

No pretendemos que la lista sea completa ni que sea correcta en su totalidad, aún falta mucho por hacer en este campo. Hay muchas figuraciones en su taxonomía que no están claras todavía, como sucede con algunos grupos, en especial con los Hatractus y las Tantillas. Hemos puesto particular interés en buscar el nombre actualizado correspondiente al que figuraba en los catálogos anteriores, pero en muchos casos esta no ha quedado claro. Esperamos que otras personas con suficientes conocimientos, colecciones y bibliografía contribuyan al esclarecimiento de estos puntos confusos, con el ánimo de que algún día tengamos el Catálogo completo de las Serpientes de Colombia, antes de que ésto sea imposible por la desaparición de las especies aún no conocidas o estudiadas suficientemente.

Figuran también en el presente Catálogo algunos registros de ejemplares existentes en Colecciones de Colombia y que figuran en publicaciones antiguas y no actualizadas. Esta lista incompleta figura con las siguientes abreviaturas:

M.L.S. Museo del Instituto de La Salle, Bogotá. Indudablemente la colección herpetológica más completa del País, debida a la incansable labor del Hno. Nicéforo María.

M.S.J. Museo de Historia Natural del Colegio de San José. Medellín. Este Museo posee unos 1000 ejemplares de serpientes y su estudio ha sido realizado principalmente por el Hno. Daniel.

M.B.L. Museo del Colegio Biffi-La Salle de Barranquilla.

\* Director del Museo de Historia Natural, Colegio San José, Medellín-Colombia.

A.D. Colección particular del Dr. Armando Dugand, Barranquilla.

Familia Typhlopidae

*Typhlops reticulatus* (Linnaeus) Ciega.

Distribución: América tropical al este de los Andes.  
En Colombia habita al oriente de los Andes orientales.  
M.L.S.

Familia Leptotyphlopidae

*Leptotyphlops brevissimus* (Shave).

Distribución: Florencia, Cúquetá en Colombia.  
Conocida únicamente de la localidad típica.  
M.L.S.

*Leptotyphlops dugandi* (Dunn). Ciega—Dormidora.

Distribución: Juananima, 20 m, 11 kms. 5 W. de Barranquilla, Atlántico, Colombia.  
Conocida únicamente de la localidad típica.  
A.D. — C.B.L. — M.S.J.

*Leptotyphlops goudotii goudotii* (Duméril, Bibron y Duméril). Ciega.

Distribución: Panamá y Colombia hasta la costa Caribe de Venezuela; Trinidad e Islas Bonaire y Margarita.  
M.L.S.

*Leptotyphlops goudotii magnamaculatus* (Taylor). Ciega.

Distribución: Islas de Honduras y de San Andrés y Providencia.

*Leptotyphlops joshuai* (Dunn). Ciega.

Distribución: Andes centrales y occidentales en los Departamentos de Antioquia y Caldas.  
M.S.J.

*Leptotyphlops macrolepis* (Peters). Ciega.

Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela y Norte de Brasil.  
M.L.S.

*Leptotyphlops nicefori* (Dunn). Ciega.

Distribución: Mogotes, Santander, Colombia.  
Conocida únicamente de la localidad del tipo.  
M.L.S.

Familia Anomalepidae

*Lityphlops albirostris* (Peters). Ciega.

Distribución: Sur de Centroamérica y norte de Suramérica, incluyendo a Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Curazao.  
A.D.

*Liotyphlops anops* (Cope). Ciega.

Distribución: Departamentos de Santander y Cundinamarca, Colombia.  
M.L.S.

*Liotyphlops cucutae* (Dunn). Ciega.

Distribución: Cúcuta, Norte de Santander, Colombia.  
Conocida únicamente de la localidad del tipo.  
M.L.S.

*Liotyphlops metae* Dunn. Ciega.

Distribución: Villavicencio, Meta, Colombia.  
Conocida únicamente de la localidad del tipo.  
M.L.S.

*Liotyphlops ternetzii* (Boulenger). Ciega.

Distribución: Esta especie es incierta para Colombia, pues en un principio figuraba como *Helminthopsis ternetzii* Boulenger, y como tal aparece en el Catálogo del Hno. Nicefaro Marfa y el del Hno. Daniel, cuya distribución sería: Llanos orientales de Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina septentrional. En el Catálogo de serpientes de América de Peters y Orejas—Miranda (1970), aparece la sinonimia correspondiente pero restringida únicamente a Brasil y Argentinam y no aparece la correspondiente a los ejemplares de Colombia.  
M.L.S.

*Helminthophis praeocularis* (Amaral). Ciega.

Distribución: Colombia, Tolima, Santander y Norte de Santander.  
M.L.D.

*Helminthophis flavoterminalis* (Peters). Ciega.

Distribución: Venezuela y Colombia.

*Helminthophis flavoterminalis* (Peters). Ciega.

Distribución: Venezuela y Colombia.

*Anomalepis colombia* (Marx). Ciega.

Distribución: Colombia: La Selva, Puerto Rico, Departamento de Caldas.

Familia Aniliidae

*Anilius scytale scytale* (Linnaeus). Falsa coral.

Distribución: Amazonía peruana, Ecuador, Colombia; norte de Brasil, Guayanas; sureste de Venezuela.  
M.L.S.

Familia Boidae

*Boa constrictor constrictor* (Linnaeus). Boa.

Distribución: Amazonía de Suramérica hasta Argentina y Paraguay; Trinidad y Tobago.

*Boa constrictor imperator* (Daudin). Boa—Alfombra.

Distribución: Méjico hasta el noreste de suramérica; Andes orientales de Colombia, Ecuador y Perú.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L. — A.D.

*Corallus annulatus annulatus* (Cope). Boa — Poa.

Distribución: Desde Nicaragua hasta Colombia.  
M.L.S.

*Corallus annulatus colombianus* (Rendahi y Vestergren).

Boa — Poa.

Distribución: Partes bajas del Pacífico Colombiano y noreste del Ecuador.

*Corallus caninus* (Linnaeus). Boa.

Distribución: Valles del Amazonas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Guayanas.  
M.L.S.

*Corallus enydris cookii* (Gray). Macabrel—Oroya — Mapaná tigre.

Distribución: Colombia, Venezuela, Brasil septentrional, Trinidad y Pequeñas Antillas.  
M.L.S. — M.B.L. — A.D.

*Epicrates cenchria maurus* (Gray). Tornasol—Boa azul—Sobrecama.

Distribución: Desde Costa Rica hasta el norte de Colombia; probablemente en el norte de Guayanas; Trinidad, Tobago e Islas Margarita.  
M.L.S. — M.S.J. — A.D.

*Epicrates cenchria cenchria* (Linnaeus). Boa tornasol - Sobrecama.

Distribución: Valles del Amazonas; sureste de Venezuela y Costas de Guayanas.

*Eunectes murinus gigas* (Latreille). Anaconda—Gilio de agua—Petaca.

Distribución: Colombia, Venezuela, Guayanas y Trinidad.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.

*Trachiboa boulengeri* (Peracca).

Distribución: Bosques pluviosos del Pacífico del Ecuador, Colombia y Panamá.  
M.L.S. — M.S.J.

#### Familia Colubridae

*Atractus nicefor* (Amaral). Ciega.

Distribución: Parte alta de las regiones septentrionales de Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus andinus* (Prado). Ciega.

Distribución: Colombia; Sureste de Antioquia.  
Conocida únicamente de la región del tipo.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus arangoi* (Prado). Caminera.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente en Puerto Asis, Putumayo.  
M.L.S.

*Atractus badius* (Boie). Caminera.

Distribución: Noreste de Suramérica hasta el oriente de los Andes y Argentina.  
M.L.S.

*Atractus biseriatus* (Prado). Caminera.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de Villamaría, Caldas.  
M.L.S.

*Atractus bocourti* (Boulenger). Caminera.

Distribución: Colombia, Ecuador y Perú, según los catálogos de serpientes de Colombia de los Hnos. Nicéforo María y Daniel. En el Catálogo de Peters y Orejas—Miranda aparece restringida a Perú y Ecuador, pero no aparece el traslado de la especie colombiana a otra sinonimia.  
M.L.S.

*Atractus crassicaudatus* (Duméril, Bbron y Duméril). Caminera.

Distribución: Partes altas de Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus elaps* (Günther). Caminera.

Distribución: Oriente de regiones altas del Ecuador, norte de Perú, Colombia, Amazonas y Brasil.  
M.L.S.

*Atractus güentheri* (Wucherer). Caminera.

Distribución: Amazonía de Colombia y Brasil.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus indistinctus* (Prado). Caminera.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de Ocaña, Norte de Santander.  
M.L.S.

*Atractus iridescens* (Peracca). Caminera.

Distribución: Suramérica. El Hno. Nicéforo la ha coleccionado en San Sebastián y San Lorenzo al norte de Colombia.  
M.L.S.

*Atractus lasallei* (Amaral). Caminera.

Distribución: Regiones altas del noreste de Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus latifrons* (Günther). Caminera.

Distribución: Occidente de Brasil, oriente de Perú, oriente de Colombia.  
M.L.S.

*Atractus limitaneus* (Amaral). Caminera.

Distribución: Sur de Colombia. Conocida únicamente de La Pedrera, Río Caquetá, Comisaría del Amazonas.  
M.L.S.

*Atractus loveridgei* (Amaral). Caminera.

Distribución: Regiones altas del norte de Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus maculatus* (Günther). Caminera—Tierrera.

Distribución: Brasil.  
Obs. En el catálogo del Hno. Nicéforo aparece con la distribución de Brasil, Colombia y Bolivia. Peters y Orejas—Miranda la restringen al Brasil, pero no aparece ninguna sinónima de la especie de Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus major* (Boulenger). Caminera—Tierrera.

Distribución: Ecuador y Colombia en la vertiente amazónica, Venezuela, Brasil.  
M.L.S.

*Atractus manizalesensis* (Prado). Caminera.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de Villamaría, Departamento de Caldas.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus melanogaster* (Werner). Tierrera.

Distribución: Colombia. Departamentos de Antioquia y Tolima.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus melas* (Boulenger). Caminera—Tierrera.

Distribución: Colombia.  
M.L.S.

*Atractus multicinctus* (Jan). Caminera — Tierrera.

Distribución: Noreste del Ecuador hasta Chocó en Colombia.

*Atractus nigriventris* (Amaral). Caminera.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de Chita, Boyacá.  
M.L.S.

*Atractus obsesus* (Marx). Guardacamino.

Distribución: Colombia.

*Atractus obtusirostris* (Werner). Caminera.

Distribución: Colombia. Noroeste de Ibagué, Pensilvania y Sasaima.  
M.L.S.

*Atractus oculotemporalis* (Amaral). Caminera - Guardacamino.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de Jericó, Departamento de Antioquia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus pamplonensis* (Amaral). Guardacamino.

Distribución: Colombia. Pamplona, Norte de Santander.  
M.L.S.

*Atractus punctiventris* (Amaral). Guardacamino.

Distribución: Colombia. Villavicencio, Intendencia del Meta.  
M.L.S.

*Atractus reticulatus reticulatus* (Boulenger). Guardacamino.

Distribución: Colombia y Brasil.  
M.L.S.

*Atractus sanctamartae* (Dunn). Tierrera.

Distribución: Colombia; Sierra Nevada de Santa Marta.

*Atractus sanguineus* (Prado). Guardacamino.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente por el ejemplar tipo proveniente de Yarumal, Antioquia que se conserva en el Museo del Colegio de San José.  
M.L.S. — M.S.J.

*Atractus torquatus* (Duméril, Bibron y Duméril). Guardacamino.

Distribución: Amazonía de Colombia y Bolivia; Amazonas, Brasil.

*Atractus trivittatus* (Amaral). Guardacamino.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de Chita, Dto. de Santander.  
M.L.S.

*Atractus variegatus* (Prado). Caminera — Guardacamino.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de La Uita, Depto. de Boyacá.  
M.L.S.

*Atractus vertebrolineata* (Prado). Guardacamino.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de Ocaña, Departamento de Santander.  
M.L.S.

*Atractus wagleri* (Prado). Guardacamino.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de Humbo, Dpto. de Boyacá.  
M.L.S.

*Atractus werneri* (Peracca). Tierrera - Guardacamino.

Distribución: Regiones altas de Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Chironius carinatus* (Linnaeus). Lomo de machete — Azotadora.

Distribución: América central; Suramérica tropical; Islas de Trinidad, Guadalupe y San Vicente.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.

*Chironius fuscus* (Linnaeus). Azotadora.

Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela, Guayanas, centro del Brasil y Perú.

M.L.S.

*Chironius monticola* (Poze). Lomo de machete — Azotadora.

Distribución: Venezuela, Colombia y Bolivia.

*Chironius scurrulus* (Wagler). Zotadora.

Distribución: Amazonas, Brazil, Sureste de Colombia y Perú.

*Clelia clalia clalia* (Daudin). Cazadora negra — Terciopelo — Mapaná prieta.

Distribución: Desde Méjico hasta Brasil.

M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.

*Clelia equatoriana* (Amaral). Cazadora negra.

Distribución: Panamá, Colombia y Ecuador.

*Clelia scytalina* (Cope). Cazadora negra.

Distribución: Méjico, Costa Rica y Colombia.

*Apostolepis nicefori* (Amaral).

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de La Pradera, Bajo Caquetá.

M.L.S.

*Dendrophidion bivittatus* (Duméril, Bibron y Duméril). Cazadora.

Distribución: Regiones altas de Colombia.

M.L.S. — M.S.J.

*Dendrophidion percarinatus* (Cope). Cazadora.

Distribución: América central hasta Colombia.

*Dendrophidion bashelli* (Dunn). Cazadora.

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de volcanes, Departamento de Cundinamarca.

M.L.S.

*Dendrophidion dendrophis* (Schlegel). Cazadora.

Distribución: América central y norte de Suramérica.

*Coniophanes fissidens fissidens* (Günther).

Distribución: Desde Méjico hasta Ecuador.

M.L.S.

*Coniophanes fissidens andresensis* (Bailey).

Distribución: San Andrés y Providencia.

*Diaphorophphis laevis* (Werner).

Distribución: Colombia.

*Dipsas indica indica* (Laurenti).

Distribución: Brasil, Colombia, Guayana Británica, Ecuador y Perú.

M.L.S. — M.S.J.

*Dipsas pavanina* (Schlegel).

Distribución: Guayanas, Venezuela, Brasil, Colombia y Bolivia.

M.L.S.

*Dipsas pratti* (Boulenger).

Distribución: Cordillera occidental de Colombia.

M.L.S. — M.S.J.

*Dipsas temporalis* (Werner).

Distribución: Costa Pacífica de Suramérica; en Ecuador y Colombia; Costa Atlántica de Panamá.

M.L.S. — M.S.J.

*Dipsas oreas* (Cope).

Distribución: Colombia, Ecuador y Panamá.

M.L.S.

*Dipsas variegata variegata* (Duméril, Bibron y Duméril).

Distribución: Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador y Perú.

M.L.S.

*Drepanoldes anomalus* (Jan).

Distribución: Centro de Bolivia y Colombia.

*Drymarchaon corais corais* (Boie).

Distribución: Colombia y Venezuela; Trinidad y Tobago; Guayanas; Brasil tropical; Paraguay; Argentina septentrional; Bolivia, Perú y Ecuador orientales.

M.L.S. — M.S.J.

*Drymarchon corais melanurus* (Duméril, Bibron y Duméril). Cazadora — Matacaballo.

Distribución: Costa Pacífica de Colombia y Ecuador; Norte de Venezuela; América Central hasta Veracruz, Méjico en la Costa Atlántica y Nicaragua en la Costa Pacífica.

M.L.S. — M.S.J.

*Drymobius rhombifer* (Günther). Azotadora.

Distribución: Nicaragua y Perú; Venezuela, Colombia y Ecuador.

M.L.S. — M.S.J.

*Drymobius margaritiferus margaritiferus* (Schegel). Azotadora.

Distribución: Partes bajas y ligeramente elevadas desde el sur de Texas, a lo largo de la costa del caribe hasta el norte de Suramérica.

*Drymoluber dichrous* (Peters).

Distribución: Colombia, Ecuador, oriente de Perú, Norte de Brasil, Amazonía Venezolana.

M.L.S.

*Enufius flavitorques flavitorques* (Cope)

Distribución: Desde Guatemala hasta Colombia.

- Enulius sclateri* (Boulenger).  
Distribución: Nicaragua, Panamá y Colombia.
- Erythrolampus aesculapii aesculapii* (Linnaeus). Coral.  
Distribución: Amazonía de Suramérica.
- Erythrolampus bisona* (Jan). Coral.  
Distribución: Desde Costarica hasta el Colombia y el norte de Venezuela.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.
- Erythrolampus minus micrurus* (Dunn y Vailey). Coral.  
Distribución: Del Atlántico de Panamá hasta el Pacífico de Colombia y Ecuador.
- Geophis brachycephalus* (Cope).  
Distribución: Cordillera Central, sur de Costa Rica hasta Colombia.
- Helicops angulatus* (Linnaeus).  
Distribución: Venezuela y Colombia hasta Bolivia; Trinidad, Ecuador y Perú.
- Helicops daniell* (Amaral). Mapaná de agua.  
Distribución: Valles del Atrato y Magdalena; desde Barranquilla hasta Barrancabermeja, en Colombia.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.
- Helicops pastarazae* (Shreve).  
Distribución: Región amazónica de Ecuador y Colombia.
- Helicops palylepis* (Günther).  
Distribución: Amazonía de Brasil, Colombia, Perú y Bolivia.  
M.L.S.
- Helicops scalaria* (Jan). Mapaná de agua.  
Distribución: Maracaibo en Venezuela y áreas adyacentes a Colombia.  
M.L.S.
- Mastigodrias danieli* (Amaral). Cazadora.  
Distribución: Colombia. Conocida únicamente de la localidad típica que es Medellín.  
M.L.S. — M.S.J.
- Mastigodryas pleei* (Duméril, Bibron y Duméril). Lobera—Rama.  
Distribución: Regiones áridas de Panamá; Colombia y Venezuela; Islas de Margarita y Trinidad.  
M.L.S. — M.S.J.
- Ninia atrata atrata* (Hallowell).  
Distribución: Sureste de América Central desde Panamá y Costa Rica hasta Ecuador, Venezuela y Trinidad.  
M.L.S. — M.S.J.
- Nothopsis rugosus* (Cope).  
Distribución: Costa Atlántica de Nicaragua, Costa Rica y Panamá; Costa Pacífica de Colombia y Ecuador.
- Oxybelis aeneus* (Wagler). Bejuca—Bejuquilla mohosa.  
Distribución: sur de Arizona, Méjico, América Central, este de los Andes en el norte medio de Suramérica.  
M.L.S. — M.S.J.
- Oxybelis argenteus* (Wagler). Bejuca—Bejuquilla.  
Distribución: Suramérica en los Andes orientales.  
M.L.S.
- Oxybelis brevirostris* (Cope). Bejuca.  
Distribución: Tierras bajas del Caribe en América Central desde Nicaragua hasta el Pacífico de Colombia y Ecuador.  
M.L.S.
- Oxybelis fulgidus* (Daudin). Bejuca—Sobrecarga.  
Distribución: Méjico, América Central y región tropical de Suramérica en los Andes Orientales.  
M.L.S.
- Oxyrhopus formosus* (Wied).  
Distribución: Bosques de Suramérica al norte de los 20° de latitud.
- Oxyrhopus leucomelas* (Werner).  
Distribución: Vertiente amazónica del Ecuador y Perú; Valle de los ríos Cauca y Magdalena.
- Oxyrhopus petola sebae* (Duméril, Bibron y Duméril).  
Distribución: Ecuador y Colombia hasta el norte de Veracruz en Méjico.  
M.L.S. — M.S.J.
- Oxyrhopus rhombifer rhombifer* (Dunn).  
Distribución: Colombia, Brasil y Bolivia.  
M.L.S. — M.S.J.
- Oxyrhopus petola digitalis* (Reuss).  
Distribución: Amazonía al norte de Bolivia, Perú y Ecuador; costa y centro del Brasil en las áreas montañosas; región del Chocó en Colombia y al oriente de Panamá.
- Oxyrhopus melanogenys* (Linnaeus).  
Distribución: Amazonía de Colombia, Bolivia, Perú y Brasil.  
M.L.S.
- Paroxyrhopus undulatus* (Jensen).  
Distribución: Brasil y Colombia.

*Philodryas viridissimus* (Linnaeus).

Distribución: Valle del Amazonas y Paraguay desde Colombia, Venezuela y Guayanas hasta la Argentina.

*Pliocercus euryzonus euryzonus* (Cope). Víbora.

Distribución: Amazonía de Brasil, Colombia y Ecuador; Panamá.

*Phimophis guianensis* (Trochel). Víbora.

Distribución: Desde Panamá hasta Surinán.

*Pseudolvoa coronata* (Schneider).

Distribución: Guayanas; Amazonía al occidente de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

*Pseudoboa newiedii* (Duméril, Bibron y Duméril). Coral macho—Lobera colorada. Cazadora.

Distribución: Costa Pacífica de Panamá; Del interior de Colombia, hasta Surinán; Islas de Trinidad y Tobago.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L. — R.D.

*Pseudoerx plicatilis plicatilis* (Linnaeus).

Distribución: Colombia y Surinán hasta Bolivia, Paraguay y norte de Argentina.

*Pseustes poecilonotus* (Günther). Cazaodra—Matacaballo.

Distribución: Méjico; Centroamérica; norte de Suramérica en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Trinidad.

*Pseustes shropshirei* (Barbour Amaral). Cazadora—Matacaballo.

Distribución: Costa Rica; Panamá; Pacífico Colombiano y Ecuatoriano.  
M.L.S. — M.S.J.

*Rhadinea brevirostris* (Peters).

Distribución: Amazonía, Guayanas, Bolivia.

*Rhadinea lateristriga lateristriga* (Berthold).

Distribución: Vertiente del Pacífico, centro de Colombia y Ecuador.  
M.L.S. — M.S.J.

*Rhadinea lateristriga multilineata* (Peters).

Distribución: Costa Pacífica de Colombia y Venezuela.  
M.L.S.

*Rhadinea pachyura fulviceps* (Cope).

Distribución: Panamá; Pacífico Colombiano y Ecuatoriano.

*Rhinobotryum bovellii* (Anderson).

Distribución: Honduras; Costa Rica; Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela.

*Rhinobotryum lentiginosus* (Scopoli).

Distribución: Río Amazonas y Paraguay en suramérica tropical  
M.L.S. — M.S.J.

*Sibon nebulata nebulata* (Linnaeus). Mapaná (falsa)

Distribución: Méjico, América central; Suramérica;  
M.L.S. — M.S.J.

*Sibon nebulata leucomelas* (Boulenger). Mapaná (Falsa).

Distribución: Borda de Colombia—Panamá, incluyendo la costa de Colombia hasta el Ecuador.

*Sibon nebulata popayanensis* (Peters). Mapaná (Falsa).

Distribución: Río Cauca, Colombia.

*Spilotes pullatus pullatus* (Linnaeus). Cazaodra — Toche voladora. Azotadora—Petaquera.

Distribución: Costa Rica y Panamá hasta Paraguay y norte de Argentina; Islas de Trinidad y Tobago.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L. — A.D.

*Stenorrhina degenhardtii degenhardtii* (Berthold).

Distribución: Méjico; Venezuela; Pacífico de Colombia y Ecuador.  
M.L.S. — M.S.J.

*Stenorrhina degenhardtii acellata* (Jan).

Distribución: Venezuela y posiblemente Colombia.

*Synopsis lasallei* (Nicéfaro María).

Distribución: Amazonía de Colombia y Ecuador.  
M.L.S. — M.S.J.

*Siphlophis cervinus* (Laurenti).

Distribución: Colombia, Bolivia; Zona del Canal y Trinidad.

*Tripanurgos compressus* (Daudin).

Distribución: Colombia, Bolivia, Amazonas, hasta Trinidad y Tobago.

*Hydrodynastes bicinctus* (Herrman).

Distribución: Guayanas; amazonía del Brasil, Colombia y Venezuela.

*Hydrops martii martii* (Wagler).

Distribución: Regon amazónica de Colombia y Brasil.

*Hydrops triangularis triangularis* (Wagler).

Distribución: Desde Colombia a Brasil.

*Hydrops trinagularis venezuelensis* (Poze).

Distribución: Río Orinoco en Venezuela y Sureste de los Llános de Colombia hasta el Río Vaupés.

*Imantodes cenchoa cenchoa* (Linnaeus). Cabuya – Bejuca – Sapa.

Distribución: Panamá; norte de Suramérica hasta Paraguay, Bolivia y Argentina; Trinidad.  
M.L.S. – M.S.J. – M.B.L. – R.D.

*Imantodes inornatus* (Boulenger). Bejuca.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.

*Imantodes lentiforus* (Cope). Bejuca.

Distribución: Amazonas, Brasil; Amazonas, Colombia, Ecuador y Perú.

*Lampropeltis triangulus microphollis* (Cope). Coral-Coral ratonera.

Distribución: Costa Rica, Panamá; Costa Caribe de Colombia; Ecuador y Venezuela.  
M.L.S. – M.S.J.

*Leimadophis albiventris* (Jan). Falsa coral.

Distribución: Andes ecuatorianos, Suramérica.

*Leimadophis brimaculatus bimaculatus* (Cope). Falsa coral – Sabanera.

Distribución: Andes de Colombia.  
M.L.S. – M.S.J.

*Leimadophis bimaculatus lamonae* (Dunn). Coral – Sabanera.

Distribución: Departamentos de Antioquia y Caldas, Colombia.  
M.L.S. – M.S.J.

*Leimadophis epinephelus juvenilis* (Dunn). Coral – Sabanera.

Distribución: Costa Rica, Panamá y Colombia.  
M.L.S. – M.S.J.

*Leimadophis melanotus* (Shav). Sabanera.

Distribución: Colombia, Venezuela, Trinidad, Tobago y Granada.  
M.L.S. – M.S.J.

*Leimadophis typhus* (Linnaeus). Sabanera.

Distribución: Suramérica.  
M.L.S. – M.S.J.

*Leimadophis pseudocobella* (Peracca). Coral.

Distribución: andes centrales y occidentales de Colombia.  
M.L.S. – M.S.J.

*Leimadophis pygmaeus* (Cope). Coral.

Distribución: Alto Amazonas de Colombia y Ecuador.  
M.L.S.

*Leimadophis taeniurus* (Tschudi). Coral.

Distribución: Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú.

*Leimadophis reginae reginae* (Linnaeus). Coral.

Distribución: Norte de Suramérica, occidente de los Andes; Brasil.  
M.L.S.

*Leptoderra annulata annulata* (Linnaeus). Mapaná – Mapaná montuna.

Distribución: Amazonía de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.  
M.L.S. – M.S.J.

*Leptodeira annulata ashmeadi* (Hallowell). Mapaná – Mapaná montuna.

Distribución: Montañas de Sta. Marta, Colombia; norte de Venezuela; Trinidad y Tobago; Islas Margarita, Venezuela.

*Leptodeira septentrionalis ornata* (Bocourt). Mapaná – Mapaná montuno.

Distribución: Costa Rica, Panamá y Colombia y Venezuela en la costa caribe; Costa Pacífica de Colombia y Ecuador.  
M.L.S. – M.S.J.

*Leptodeira annulata rhombifera* (Günther). Mapaná – Mapaná montuno.

Distribución: Guatemala, Panamá, Colombia; Archipiélago de las Perlas, Panamá.

*Leptophis ahaetulla bocaurti* (Boulenger).

Distribución: Ecuador; Islas Gorgona, Colombia.

*Leptophis ahaetulla chocoensis* (Oliver).

Distribución: Chocó, Colombia.

*Leptophis ahaetulla copel* (Oliver).

Distribución: Área de división entre los Ríos Orinoco y Río Negro en Venezuela, Brasil y Colombia.

*Leptophis ahaetulla nigramarginatus* (Günther).

Distribución: Brasil; Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú.

*Leptophis ahaetulla occidentalis* (Günther). Bejuca verde – Voladora verde.

Distribución: Centro América desde Nicaragua en la Costa Caribe y Costa Rica en la Costa Pacífica hasta la Costa Pacífica de Venezuela, Colombia y Ecuador.  
M.L.S.

*Leptophis ahaetulla ortonii* (Cope).

Distribución: Valle del Amazonas en el sur del Colombia; parte media del Amazonas del Brasil y extremo norte de Bolivia.

*Leptophis depressirostris* (Cope).

Distribución: Vertiente Atlántica de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, Vertiente Pacífica de Colombia y Ecuador.

*Leptophis riveti* (Despax).

Distribución: Ecuador; Amazonas del Perú, Colombia; Panamá.

*Liophis cobella* (Linnaeus).

Distribución: Norte de Suramérica al occidente de los Andes.  
M.L.S. — M.S.J.

*Liophis purpurans* (Duméril, Bibron y Duméril).

Distribución: Guayanas; parte alta de la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú.  
M.L.S.

*Lygophis antioquiensis* (Dunn).

Distribución: Colombia. Conocida únicamente de San Pedro, localidad del tipo.  
M.L.S. — M.S.J.

*Lygophis bourcier* (Jan).

Distribución: Ecuador y Colombia.

*Lygophis lineatus lineatus* (Linnaeus). Guardacamino—Sabanera

Distribución: Panamá; Norte de Suramérica; Andes Ecuatorianos.  
M.L.S.

*Lygophis tristriatus* (Rendahl y Vestergren).

Distribución: Cauca, Colombia. Conocida únicamente de la localidad del tipo.

*Masticophis mentovarius centralis* (Roze).

Distribución: Panamá y norte de Colombia hasta Venezuela.

*Mastigodryas bifossatus striatus* (Amaral).

Distribución: Occidente de Colombia, sur de Venezuela y norte de Brasil.

*Mastigodryas boddaerti boddaerti* (Sentzen). Yaruma.

Distribución: Venezuela, Ecuador, Occidente de Colombia, norte de Brasil.  
M.L.S. — M.S.J.

*Mastigodryas boddaerti ruthveri* (Stuart). Yaruma.

Distribución: Conocida únicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

*Tantilla alticola* (Boulenger). Ciega.

Distribución: Chocó, región de Colombia.  
M.L.S.

*Tantilla longifrontalis* (Boulenger). Ciega.

Distribución: Vertiente occidental de los Andes de Colombia y Ecuador.  
M.L.S.

*Tantilla melanocephala melanocephala* (Linnaeus). Guardamina — Ciega.

Distribución: América central, suramérica al este de los Andes, incluidos el norte de Argentina y Uruguay. M.L.S. — M.S.J.

*Tantilla nigra* (Boulenger). Ciega.

Distribución: Chocó, Colombia.  
M.L.S.

*Tantilla reticulata* (Cope). Ciega.

Distribución: Costa Rica; Río San Juan, Colombia.  
M.L.S.

*Tantilla semicincta* (Duméril, Bibron y Duméril). Ciega.

Distribución: Panamá y Colombia.  
M.L.S.

*Thamnodunastes strigillis* (Thunberg). Veinticuatro—Mapaná de raya.

Distribución: Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina.  
M.L.S. — M.S.J. — J.C.N. — A.D.

*Thamnodynastes pallidus* (Linnaeus). Veinticuatro—Pataca alazán.

Distribución: Guayanas; Brasil; Perú, Venezuela. La especie no aparece registrada en el "Catálogo de Serpientes de América" de Petera y Orejas—Miranda, Sin embargo es abundante en la Costa Atlántica.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.

*Scaphiodontophis dugandi* (Roze).

Distribución: Urabá, Antioquia, Colombia.  
Obs. Esta especie coleccionada en Turbo por el doctor Armando Dugand y clasificada en su honor por el doctor James R. Rose, es posible que no halla sido posible su inclusión en el Catálogo de Serpientes de América de Peters y Orejas—Mirando por su reciente clasificación.

*Phimophis guianensis* (Troschel).

Distribución: Panamá y Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Xenodon rabdocephalus rabdocephalus* (Wiel). Sapa.

Distribución: Nicaragua P; Centro América hasta Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.

*Xenodon scyerus* (Linnaeus). Sapa.

Distribución: Amazonía de Suramérica.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.

*Tretanorhinus taenictus* (Boulenger).

Distribución: Colombia y Ecuador.  
M.L.S.

*Tripanurgos compresus* (Daudin).

Distribución: Amazonía de Bolivia y Colombia; Panamá.  
M.L.S.

## Familia Hydrophiidae.

*Pelamis platurus* (Linnaeus). Serpiente marina.

Distribución: Mar Indo-Australiano desde Siberia hasta  
Tasmania; Océano Pacífico; Costas america-  
nas desde Méjico hasta Ecuador.  
M.L.S. — M.S.J.

## Familia Elapidae.

*Leptomicrurus narduccii* (Jan).

Distribución: Vertiente amazónica de los Andes de Colom-  
bia, Ecuador, Perú y Bolivia; Estado de Acre,  
Brasil.  
M.L.S.

*Micrurus ancoralis jani* (Schmidt). Coral.

Distribución: Desde la región oriental de Panamá hasta el  
Chocó, Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Micrurus bocourti sangilensis* (Nicéforo Marfa). Coral.

Distribución: Dpto. de Santander, Colombia.  
M.L.S.

*Micrurus clarki* (Schmidt). Coral.

Distribución: Desde Costa Rica hasta Colombia.

*Micrurus dissoleucus dissoleucus* (Cope). Coral.

Distribución: Desde el norte de Colombia hasta el oriente  
de Venezuela.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L. — A.D.

*Micrurus dissoleucus melanogenys* (Cope). Coral.

Distribución: Santa Marta, Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Micrurus dissoleucus nigrirostris* (Schmidt). Coral-Candelilla.

Distribución: Región del alto Magdalena, Colombia.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L. — A.D.

*Micrurus dumerilli dumerilli* (Jan). Coral.

Distribución: Valle del Cauca, Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Micrurus dumerilli antioquiensis* (Schmidt). Coral.

Distribución: Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Micrurus dumerilli carinicauda* (Schmidt). Coral.

Distribución: Desde el norte de Venezuela hasta el Norte  
de Santander, Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Micrurus dumerilli colombianus* (Griffin). Coral.

Distribución: Santa Marta, Colombia.

*Micrurus dumerilli transandinus* (Schmidt). Coral.

Distribución: Pacífico Colombiano y norte del Ecuador.

*Micrurus filliformis subtilis* (Roze). Coral.

Distribución: Vaupés y Amazonas, Colombia.  
M.L.S.

*Micrurus hemprichii hemprichii* (Jan). Coral.

Distribución: Del oriente de Colombia y Venezuela hasta  
las Guayanas.  
M.L.S.

*Micrurus hemprichii ortonii* (Schmidt). Coral.

Distribución: Vertiente amazónica de Colombia, Ecuador  
y Perú; Brasil.  
M.L.S.

*Micrurus isazonus* (Cope). Coral.

Distribución: Venezuela; Intendencia del Meta, Colombia.

*Micrurus langsdorffi langsdorffi* (Magler). Coral.

Distribución: Desde Colombia hasta el norte de Perú; Bra-  
sil y Ecuador.

*Micrurus langsdorffi ornatisimus* (Roze). Coral.

Distribución: Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú.

*Micrurus lemniscatus helleri* (Schmidt y Schmidt). Coral.

Distribución: Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú  
y Bolivia.  
M.L.S. — M.S.J.

*Micrurus mipartitus mipartitus* (Duméril, Bibron y Dumé-  
nil). Rabo de ají.

Distribución: Panamá y Colombia.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L. — A.D.

*Micrurus mipartitus anomalus* (Boulenger). Rabo de ají.

Distribución: Montañas de Santa Marta y cordillera orien-  
tal; Andes venezolanos.

*Micrurus mipartitus decussatus* (Duméril, Bibron y Dumé-  
nil). Rabo de ají.

Distribución: Andes de Colombia; Ecuador; Posiblemente  
Perú.

*Micrurus nigrocinctus nigrocinctus* (Girard). Coral.

Distribución: Costa Rica, Panamá y Colombia.

*Micrurus psyches psyches* (Daudin). Coral.

Distribución: Guayanas, Venezuela y Colombia  
M.L.S.

*Micrurus psyches medemi* (Roze). Coral.

Distribución: Villavicencio, Colombia.

*Micrurus spixii obscurus* (Jan).

Distribución: Venezuela, Colombia y Perú.  
M.L.S.

- Micrurus spurelli* (Boulenger). Coral.  
Distribución: Occidente y Centro de Colombia.  
M.L.S. — M.S.J.
- Midrurus surinamensis surinamensis* (Ouvier). Coral.  
Distribución: Guayanas, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia.

*Familia Viperidae.*

- Bothrops asper* (Garman).  
Distribución: Méjico; América Central; Colombia y Ecuador.

- Bothrops atrox* (German). Mapaná. Taya X. Boquiadora. Macabrel. Pudridora.  
Distribución: Guayanas, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L. — A.D.

- Bothrops bilineatus smaragdinus* (Hoge). Mapaná.  
Distribución: Amazonía colombiana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

- Bothrops brazili* (Hoge). Mapaná.  
Distribución: Venezuela, Guayanas, Colombia y Brasil.

- Bothrops castelnaudi* (Duméril, Brobron y Duméril). Mapaná.  
Distribución: Bosques ecuatoriales de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú.  
M.L.S. — M.S.J.

- Bothrops colombiensis* (Hallowell). Mapaná.  
Distribución: Colombia y Venezuela.

- Bothrops Auoprurus* (Amaral). Mapaná.  
Distribución: Bosques ecuatoriales de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.  
M.L.S.

- Bothrops lansbergii* (Schlegel). Patoquilla—X 24—Mapaná—Patoco.  
Distribución: Regiones áridas y semi-áridas de las costas del Caribe en Colombia.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.

- Bothrops microphthalmus colombianus* (Rendahl y Vestergren). Mapaná.  
Distribución: Vertiente del Pacífico Colombiano.

- Bothrops nasutus* (Bocourt). Hilván—Patoquilla real—Veinticuatro—X 24.  
Distribución: Méjico, Colombia y Ecuador.  
M.L.S. — M.S.J.

- Bothrops punctatus* (García). Rabo de chucha—Rabi-seca—Mapaná.  
Distribución: Desde Panamá hasta Ecuador.  
M.L.S. — M.S.J.

- Bothrops schlegelii* (Berthold). Cabeza de candado—Colgadora—Pató—Vívora de tierra fría—Oropel.  
Distribución: Desde el sur de Méjico hasta el Pacífico del Ecuador; Venezuela.  
M.L.S. — M.S.J.

- Bothrops xanthogrammus* (Cope). Boquiadora—Mapaná.  
Distribución: Colombia y Ecuador.  
M.L.S.

*Familia Crotalidae*

- Crotalus durissus terrificus* (Lawrenti). Cascabel.  
Distribución: Colombia, Venezuela, Brasil, América Central hasta Méjico.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.

- Lachesis muta muta* (Linnaeus). Verrugoso.  
Distribución: Brasil, Guayana, Venezuela, Trinidad, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.  
M.L.S. — M.S.J. — M.B.L.

**BIBLIOGRAFIA**

1. Nicéforo Marfa, Hno. 1942. "Los Ofidios de Colombia" Rev. Acad. Col. Ciencias Exact. Físic. y Nat. Vol. 5, No.17. Bogotá, pp. 84-101.
2. Dunn, E. R. 1944. "Los Géneros de Anfibios y Reptiles de Colombia JJJ" Rev. Caldasia. Vol. III, Nro. 12. Bogotá. p.155-224.
3. Daniel, Hno. 1955. "Cómo se han clasificado las serpientes de Colombia". Rev. Fac. Nat. Agronomía, Vol. 17, No. 48. Medellín. pp.52-83.
4. Medem, F. 1968. "El desarrollo de la Herpetología en Colombia". Rev. Acad. Col. de Ciencias Exact. Fís. y Nat. Vol. XIII, No. 50. Bogotá. pp. 178-199.

5. Roze J. A. 1969. "Una nueva coral falsa del Gen. *Ecaphiodontophis*, de Colombia". *Rev. Caldasia*. Vol. X, No. 48. Bogotá. pp. 355-363.
6. Peters, J. y Braulio Orejas-Miranda, 1970. "Catalogue of the Neotropical Squamata: Part J. Snakes". Smithsonian Institution. U.S.A. pp. J-VII, 1-347.
7. Serna, M. A. 1973. "Catalogo de Ofidios del Museo de Hist. Nat. Col. S. José". Inédito. Medellín, pp. 1-30.
8. Dugand, A. 1975. "Serpentifauna de la llanura costera del Caribe". *Rev. Caldasia*. Vol. XI. No. 53. Bogotá, pp.61-82.
9. Tinoco, R. 1977. "Las Serpientes de Colombia". Editorial Mejoras. Barranquilla, pp. I-XIV. 1-105.