

**Tabla 1. Datos sociodemográficos y laborales de odontólogos paraguayos encuestados  
(n=428)**

| Variables          | Categorías                 | No. | %     |
|--------------------|----------------------------|-----|-------|
| Sexo               | Mujer                      | 360 | 84,11 |
|                    | Hombre                     | 64  | 14,95 |
|                    | No declara                 | 4   | 0,93  |
| Grupos de edad     | 20-29                      | 59  | 13,79 |
|                    | 30-39                      | 164 | 38,32 |
|                    | 40-49                      | 104 | 24,30 |
|                    | 50-59                      | 43  | 10,05 |
|                    | ≥ 60                       | 18  | 4,21  |
|                    | No declara                 | 40  | 9,35  |
| Ciudad laboral     | Asunción (capital)         | 226 | 52,80 |
|                    | Ciudades del Dpto. Central | 130 | 30,37 |
|                    | Ciudad del Este            | 25  | 5,84  |
|                    | Otras ciudades             | 47  | 10,98 |
| Situación laboral* | Clínica privada            | 348 | 81,31 |
|                    | Servicio público           | 100 | 23,36 |
|                    | Instituto de enseñanza     | 79  | 18,46 |
|                    | Seguro odontológico        | 49  | 11,45 |
|                    | Inactivo por pandemia      | 34  | 7,94  |
|                    | No declara                 | 5   | 1,17  |

*\*Observación: Más de una opción podía ser marcada para situación laboral*

*Fuente: por los autores*

**Tabla 2. Medidas de desinfección y cuidados adoptados para prevenir la propagación del COVID-19 (n=428)**

| Respuestas*  | No. | %     |
|--|-----|-------|
| Desinfección del consultorio (sillón odontológico y mobiliarios del área operatoria)             | 414 | 96,73 |
| Lavado de manos antes y después de cada procedimiento  | 400 | 93,46 |
| Desinfección de superficies con alcohol etílico al 70%   | 377 | 88,08 |
| Desinfección de picaportes, sillas u otro mobiliario en contacto con el paciente                 | 365 | 85,28 |
| Retirada de revistas y libros de la zona de espera   | 348 | 81,31 |
| Ventilación de la sala de espera   | 319 | 74,53 |
| Ventilación del área de operación durante al menos 10 minutos después de cada paciente           | 282 | 65,89 |
| Detectar la temperatura corporal y pedir salir a aquellos con una temperatura superior a 37,5 °C | 261 | 60,98 |
| Almacenamiento de abrigos; bolsas y otros artículos fuera del área operatoria                    | 254 | 59,35 |
| Desinfección de superficies con hipoclorito de sodio al 0,5%                                     | 185 | 43,22 |
| Uso de aislamiento absoluto (goma dique) siempre que sea posible                                 | 162 | 37,85 |
| Desinfección de superficies con desinfectantes habituales que contengan otros principios activos | 80  | 18,69 |
| Ninguna  | 3   | 0,70  |

*\*Observación: más de una opción podía ser marcada*

*Fuente: por los autores*

**Tabla 3. Medidas de protección individual para el odontólogo y el paciente**

| Respuestas*                                    | No. | %     |
|--|-----|-------|
| <b>Tipo de tapabocas</b>                       |     |       |
| KN95   | 209 | 48,83 |
| N95  | 95  | 22,20 |
| Quirúrgico                                     | 72  | 16,82 |
| FFP2   | 23  | 5,37  |
| Otro   | 18  | 4,21  |
| FFP1   | 3   | 0,70  |
| Prefiere no declarar                           | 3   | 0,70  |
| FFP3   | 1   | 0,23  |
| <b>Indumentaria como complemento</b>           |     |       |
| Guantes desechables no estériles               | 410 | 95,79 |
| Visera (protector facial)                      | 359 | 83,88 |
| Bata de tela tejida                            | 334 | 78,04 |
| Bata o mameluco descartable TNT                | 309 | 72,20 |
| Gafas de seguridad (lentes)                    | 290 | 67,76 |
| Bata o mameluco impermeable                    | 281 | 65,65 |
| Guantes desechables estériles                  | 88  | 20,56 |
| Prefiere no declarar                           | 2   | 0,47  |
| <b>Indumentaria para el paciente</b>           |     |       |
| Gorrito  | 383 | 89,49 |
| Cubre calzado                                  | 327 | 76,40 |
| Babero desechable                              | 303 | 70,79 |
| Gafas (lentes)                                 | 271 | 63,32 |
| Bata   | 235 | 54,91 |
| Compresa fenestrada                            | 128 | 29,91 |
| Prefiere no declarar                           | 4   | 0,93  |
| <b>Dispositivos adquiridos por la pandemia</b> |     |       |
| Ninguno  | 172 | 40,19 |
| Órbita (casco de acrílico)                     | 141 | 32,94 |
| Aparato de luz ultravioleta                    | 56  | 13,08 |
| Sistema mecánico de renovación de aire         | 44  | 10,28 |
| Acople para suctor del equipo dental           | 39  | 9,11  |
| Succión de alto poder                          | 36  | 8,41  |
| Prefiere no declarar                           | 19  | 4,44  |
| Caja de acrílico                               | 17  | 3,97  |
| Otros  | 8   | 1,87  |

\*Observación: más de una opción podía ser marcada

Fuente: por los autores

**Tabla 4. Mecanismo utilizado para desinfección y esterilización de instrumentales**

| Desinfección y/o esterilización* | No. | %     |
|----------------------------------|-----|-------|
| Autoclave                        | 353 | 82,48 |
| Desinfección química             | 209 | 48,83 |
| Estufa                           | 133 | 31,07 |
| Cuba ultrasónica                 | 98  | 22,90 |
| Prefiere no declarar             | 3   | 0,70  |
| Otra                             | 1   | 0,23  |

*\*Observación: más de una opción podía ser marcada*

*Fuente: por los autores*