

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de pacientes y necesidad de tratamiento de ortodoncia requerido. Paraguay, 2017

Variables	Necesidad de tratamiento ortodóncico				Total
	Ninguno	Electivo	Altamente deseable	Prioritario	
	<i>Sexo (p=0,793)</i>				
Femenino	34 (23,3%)	19 (13,0%)	19 (13,0%)	32 (21,9%)	104 (71,2%)
Masculino	15 (10,3%)	10 (6,85)	6 (4,1%)	11 (7,5%)	42 (28,8%)
	<i>Edad (años)</i>				
18 a 29	26 (17,8%)	17 (11,6%)	12 (8,2%)	10 (6,8%)	65 (44,5%)
30 a 39	7 (4,8)	7 (4,8%)	8 (5,5%)	15 (10,3%)	37 (25,3%)
40 a 49	3 (2,1%)	3 (2,1%)	2 (1,4%)	8 (5,5%)	16 (11,0%)
50 a 59	13 (8,9%)	2 (1,4%)	3 (2,1%)	10 (6,8%)	28 (19,2%)

Fuente: por los autores

Tabla 2. Necesidad de tratamiento de ortodoncia por componentes del IED en adultos. Paraguay, 2017

Componentes	No.	%
Diastema	30	20,4
Irregularidad anterior maxilar	36	24,5
Irregularidad anterior mandibular	65	44,2
Resalte incisal aumentado	96	65,3
Mordida cruzada anterior	7	4,8
Mordida abierta	18	12,2
Apiñamiento	81	55,1
Separación	44	29,9
Relación molar anormal	76	51,7

Fuente: por los autores

Tabla 3. Índice CPO-D según necesidad de tratamiento ortodóncico

Necesidad de tratamiento ortodóncico	n	Media	DE	IC 95%		Mínimo	Máximo
				LI	LS		
Ninguno	49	6,5	5,2	5,0	8,0	0	22
Electivo	29	8,9	5,0	7,0	10,8	1	24
Altamente deseable	25	9,0	5,9	6,6	11,4	1	22
Prioritario	43	11,8	6,0	10,0	13,7	0	22
Total	146	9,0	5,9	8,0	9,9	0	24

DE= Desvío Estándar, IC= Intervalo de Confianza, LI= Límite Inferior, LS= Límite Superior

Fuente: por los autores